

Ulgrip med Junior



Wyrób medyczny CE

wyrób medyczny

SYROP DO STOSOWANIA W KASZLU SUCHYM I MOKRYM NA DZIEŃ I NA NOC

Kaszel jest najczęstszym objawem, z jakim pacjenci pediatryczni trafiają pod opiekę lekarza. Częściej występuje u dzieci w wieku przedszkolnym – zdrowe dzieci w tym wieku mogą przebywać nawet 8 infekcji wirusowych dróg oddechowych z objawami kaszlu w jednym roku, każda trwająca około 10 dni. Ponad połowa przypadków ostrego kaszlu u dzieci spowodowana jest przez infekcje wirusowe. Kaszel jest reakcją obronną organizmu na podrażnienie błony śluzowej gardła, spowodowane infekcją lub innymi czynnikami drażniącymi, takimi jak suche lub zimne powietrze, zanieczyszczenia i pyły zawieszane w powietrzu. Kaszel, początkowo suchy i męczący może z czasem zmienić się w mokry kaszel z utrudnionym odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny, z powodu suchości śluzówek.

Rozwiązaniem jest syrop Ulgrip med Junior, który łagodzi objawy zarówno suchego, jak i mokrego kaszlu, a także przynosi ulgę, nawet w sytuacjach gdy ciężko jednoznacznie określić rodzaj kaszlu. Syrop oparty jest na surowcach roślinnych, bez dodatku sztucznych aromatów, barwników i konserwantów, które dodatkowo mogłyby podrażniać śluzówkę gardła.

Syrop Ulgrip med Junior łagodzi kaszel, ale nie tłumi go w sposób farmakologiczny, przez co nie wpływa na jego ważną fizjologiczną rolę ochronną dla dróg oddechowych.

Składniki

Skład: Cukier inwertowany syrop, woda, sproszkowany owoc bzu czarnego, ekstrakt z korzenia

prawoślazu, proszek malinowy, ekstrakt z kwiatostanu lipy, kwasek cytrynowy, kwas askorbinowy, ekstrakt z liścia bluszczu

Zastosowanie

Produkt przeznaczony: dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dorosłych w celu łagodzenia objawów zarówno suchego, jak i mokrego kaszlu, a także przynosi ulgę, nawet w sytuacjach gdy ciężko jednoznacznie określić rodzaj kaszlu. Do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc.

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja: dzieci od 3. roku życia: 2,5 ml syropu 2-3 razy na dobę, dzieci od 6. roku życia oraz dorośli: 5 ml syropu 2-3 razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć.

Aby działanie syropu było w pełni efektywne nie należy go popijać, ani przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem.

Alamo Labs